**LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE AVANT EMPLOI**

**Consignes de sécurité**

• Nocif en cas d'ingestionÉviter le contact avec la peau et les yeux,
• Éviter d'inhaler le brouillard de pulvérisation
• Porter des vêtements de protection adéquats, à savoir combinaison de travail à longues manches et bottes ; en plus, lors de la manipulation du concentré, porter aussi des gants et un masque respiratoire.
• Ne pas fumer, boire ou manger pendant la manipulation du produit. Se laver les mains et le visage avant de le faire.
• Garder le produit sous clé, hors de portée des personnes non qualifiées, des enfants et des animaux.
• Après le travail, nettoyer les équipements, se laver et changer de vêtements.
• Ne pas de jeter les restes de produit dans les fossés, mares ou cours d'eau mais les enfouir loin des sources et des puits.
• Rincer les récipients utilisés. Percer les emballages pour les rendre inutilisables puis les enterrer.

**Conditions de stabilité au stockage**

Stable pendant 24 mois au moins à partir de la date de fabrication dans les récipients d'origine intacts et fermés, à l'abri du soleil et de l'humidité.
Eviter les températures supérieures à 35° C.

**Consignes en cas d'intoxication**

• En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à grande eau
• En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

**Indications au médecin**

Il n'existe pas d'antidote spécifique, le traitement en cas d'intoxication est symptomatique.

# HERBICIDE

# Nicogan™ 40 SC

**Suspension concentrée**

**40 g/l de Nicosulfuron**

**Herbicide de post-levée.**

**Culture:** Maïs

ADAMA

**1L**

**N d'homologation : 13 1332 He**

| N° de lot: | Date de Fabrication: | Date de péremption: |
|---|---|---|
| voir sur la boîte | voir sur la boîte | 2 ans à compter de la date de fabrication |

**Distribué par:**
**ADAMA West Africa Côte d'Ivoire**
**Abidjan-Treichville, Zone 3,**
**Rue des pêcheurs,**
**15 BP 210 Abidjan 15**
**Tel : (+225) 21 35 80 15**

**Fabriqué pour:**
**SC ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONS SRL Sos**
Bucuresti-Nord nr.10,Global City Business Park,Cladirea O21, Et.6, Voluntari, Jud. Ilfov
Tel. +40-213-077612

**MODE D'EMPLOI**

**NICOGAN 40 SC** est un herbicide systémique, de post émergence pour le contrôle des adventices en culture de maïs.
**NICOGAN 40 SC** contrôle un large spectre de graminées annuelles, pérennes et des dicotylédones

**Dose d'application**

1 litre à 1,5 l/ha

**PRÉPARATION DE LA BOUILLIE**

Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié d'eau.
Ajouter la quantité adéquate de **NICOGAN 40 SC** puis le remplir au volume souhaité et traiter.
**NICOGAN 40 SC** s'applique avec un pulvérisateur à dos débitant un volume de bouillie de 250 litres par hectare.

**PRATIQUES CULTURALES**

Appliquer **NICOGAN 40 SC** en post levée des adventices du stade 2 feuilles à 8 feuilles du maïs
Faire 1 application par cycle de culture.

**COMPATIBILITÉS**

**NICOGAN 40 SC** est compatible avec les herbicides ; cependant, un test préalable de compatibilité physique est conseillé.

**DÉLAI AVANT RÉCOLTE**

Sans objet

**GARANTIE ET RESPONSABILITÉ**

Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités recommandées par la recherche, autorisée à la vente et conformes à la formule indiquée sur l'emballage. Ne pouvant contrôler les conditions particulières de stockage et d'utilisation du produit, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats insuffisants et aux dégâts pouvant être occasionnés à des personnes, des plantes des animaux et des appareils.

**ATTENTION**